

PREPARAÇÃO DE ENDOSCOPIA PARA BALÃO INTRAGÁSTRICO

O balão intra gástrico foi concebido para auxiliar a perda de peso, preenchendo parcialmente a cavidade do estômago e dando uma sensação de saciedade.

A colocação do balão intra gástrico é feita por endoscopia digestiva sob sedação profunda.

Cuidados a ter:

- Suspenda medicamentos com ácido acetilsalicílico ou outros inibidores da agregação plaquetária, 7 dias antes do exame;
- Se estiver medicado com ferro suspenda esta terapêutica 4 dias antes do exame;
- No caso de fazer anticoagulação, consulte o seu médico que controla o tratamento (deverá ter um INR igual ou inferior a 1,5);
- Se tem patologia cardíaca, informe-nos se é necessário fazer profilaxia com antibióticos;
- Se tomar anti-diabéticos orais ou se for insulino-dependente, informe o médico que o segue do Jejum que tem que fazer;
- Não suspenda os outros medicamentos (pode tomar até 8 horas antes do exame);

Preparação:

- ❖ Deve estar em Jejum de Sólidos - 8 Horas antes da hora marcada para o exame;
- ❖ Deve estar em Jejum de Líquidos - 6 Horas antes da hora marcada para o exame;
- ❖ Em caso de doença que não possa cumprir com o jejum de 6 horas, contactar o Instituto Gastrenterologia Hepatologia;

Nota: Deve sair do IGH acompanhado. Não pode conduzir por um período de, pelo menos, 12 horas.

Se for a primeira vez que vem ao IGH, traga os exames anteriores, caso já os tenha realizado alguma vez.

No dia do exame leve uma lista com o nome dos medicamentos que toma, assim como se for alérgica a medicamentos ou alimentos, escreva quais as alergias.

Recomendamos que no dia do exame não traga objectos de valor, o IGH não se responsabiliza pelo seu desaparecimento.